



KLINIKUM
NÜRNBERG

Fallbeispiel Delir

● ● ● ● Zentrum für Altersmedizin,
Campus Nord

Der 87-jährige, multimorbide Patient Andreas Müller wurde vor vier Tagen bei V. a. einen Infekt stationär aufgenommen. Er habe laut der Ehefrau in letzter Zeit an Gewicht verloren, trinke wenig und sitze die meiste Zeit des Tages teilnahmslos in seinem Rollstuhl, weshalb die häusliche Versorgung momentan nicht möglich ist. Seit vorgestern zeigt sich der Patient in seiner Aufmerksamkeit eingeschränkt, zeitlich und örtlich desorientiert und danebenredend. Zwischendurch hat er auch klare Phasen. Tagsüber ist er schläfrig, wohingegen er nachts motorisch unruhig ist.

Gehen Sie nun zu Herrn Müller und identifizieren Sie potenzielle Risikofaktoren / Auslöser, die zu seinem Delir beigetragen haben könnten.



PARACELSUS
MEDIZINISCHE
UNIVERSITÄT



KLINIKUM
NÜRNBERG

Instruktion zum „Delir-Raum“

■ ■ ■ ■ **Zentrum für Altersmedizin,
Campus Nord**

- Am Patienten bzw. in dessen Umgebung sind 9 häufige Risikofaktoren / Auslöser eines Delirs dargestellt:
 - ➔ Diese sind mit einem Buchstaben und einer Nummer markiert
 - ➔ Eintragen des Buchstabens unter der entsprechenden Nummer in die Lösungswort-Karte
- Im Anschluss: Fallzusammenfassung
 - ➔ Sortieren verschiedener Maßnahmen für die dargestellte Situation auf einer Magnet-Tafel nach „richtig“ und „falsch“
- Zeit: 20 Minuten
- Brille und Kopfhörer sind kontinuierlich zu tragen
- Nach Ablauf der Zeit: Reflexion
- **WICHTIG:** Inhalt und Lösungswort bitte nicht weitertragen, damit Ihre Kolleg/-innen auch von der Erfahrung profitieren können!



PARACELSUS
MEDIZINISCHE
UNIVERSITÄT